

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-4-66 496363

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS** (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS  
C. C. P. : ORLÉANS 4.604.25

**ABONNEMENT ANNUEL**

**15 Francs**

Supplément n°3 au Bulletin n° 67 d'Avril 1966  
AVERTISSEMENTS

18 Avril 1966 - 10 -  
ARBRES FRUITIERS

## TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les conditions climatiques sont très favorables aux projections d'ascospores et aux contaminations.

Malheureusement, dans la plupart des cas, les derniers traitements ont été effectués dans de très mauvaises conditions par suite des pluies abondantes et fréquentes.

Tant que les conditions climatiques actuelles persisteront, il y aura lieu de profiter de toutes les possibilités de traitements. Une nouvelle application doit donc être effectuée dès que possible.

## INFORMATIONS

## ARBRES FRUITIERS

### MONILIA DU CERISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à l'évolution de cette maladie. Nous rappelons les termes de notre bulletin du 4 Avril ; une nouvelle application est nécessaire immédiatement après la floraison, à la chute des pétales (stad. G)

## CHENILLES DEFOLIATRICES, PUCERONS, PSYLLES, ARAIGNEES ROUGES

On observe une activité parfois importante de ces ravageurs dans certains vergers.

Il y a donc lieu d'être vigilant afin d'intervenir le cas échéant, en ajoutant un produit efficace contre ces ravageurs à la bouillie destinée à combattre les Tavelures et le Monilia.

## PETITS FRUITS

### PUCERONS DU FRAISIER

La présence de ces ravageurs est constatée dans de nombreuses cultures. C'est le puceron jaune, responsable de la transmission des maladies à virus qui est le plus abondant. Un traitement est donc conseillé en utilisant un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné. Sur les variétés précoces où la floraison est commencée, il y a lieu de choisir un aphicide non toxique pour les abeilles conformément aux indications données dans notre bulletin technique n° 67.

Sur ces variétés précoces l'adjonction d'un fongicide tel que le Captane, le Phaltane, le Thirame, le Disulfanid permettra de combattre la pourriture grise.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
agricoles,  
G. RIBAUT.  
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
G. BENAS.

Imprimé à la Station d'Orléans -

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

P123